横濱支那街ニ得タル楊桃

此

果

雷

EII 街

度 =

=

在

ラ

其

有ラ野

外

生ズル樹(天然生ニ

ハ非ラズ)ニ

結ブ

Æ

,

٠, ŋ

酸

味

峻

烈之ヲ

р

=

**≥** 

テ辟

易

ス

ŀ

上記

₹

那

得

タ

ıν

モ

,

/ヲ寫生

セ フコ 於

jν

٠, ŀ ・アリ

リ但シ其葉花圖ハ之ヲ書ヨリ

|轉寫セ

鐘

話 阈

類

対対 匫

チ ۱۱۰

音

ラ ŋ

シ

テ之ヲ追

入

也

日 †

/ 廣東附

近

=

デ

秋頭其果實大樹

ニ實リ屢鳥

來リ襲フ所

ጉ ト答

ナ

jν

゚ヺ

Ù

テ

4

時ヲ期シ

テ

爲二他鄉

ノ人ニハ奇觀

タル 類

アラ失

ハズト

丽

ジテ此

=

揭

7 E メ

w

果實

ラ

圖

客年

·九月横濱

市

ノ支那街ヲ搜シテ

種

ノ果實ヲ得

タリ試ニ

支那

入

問

۲۴

楊桃

ラ乃

チ

求

, テ歸

ŋ

知己

横濱植物會々員

久

內

清

孝

## 澶 支 那 徣 得 厚 ル 楊

桃

テ或 ス 其培養 拁 n n 極 學者 方 ヲ 得 メ = テ 存 ズ ۰ 也 美麗 ŀ 本 テ w 品 樹 雖 モ 亦 ヲモ ナ ۴ 孰 ÷ w 本 漿 蓄 樹 n 7 果 3/ ッ ヲ w 栽植 カ島 Æ = 元 **≥**⁄ þ , 一新世界 テ五 **≥**⁄ ۱ر (馬來多島 果中 テ其果實ヲ得 立
鋭
稜 Ì ニ糖分ヲ生ジテ甘酸宜シキ ファ æ 有 海 , 中 <del>.</del> 3 、果膚 ルベ シ ルヲ待ツ即チ支那 军 シ 群 島) ŀ 滑熟シテ黄色ヲ呈シ多肉多漿 言 / 原産 ŋ 二適ヒ ナ ノ南方暖地 ŋ ŀ 以 言ヒ又或 シテ 食用 モ亦其栽植區 ヘル 學者 ŀ ナ 1 果 シ 肉 得 ۸ر 人其原產 アラ有 域 べ キ Ì ス此 至 地 = 果 屬 w ハ今之ヲ 故 肉 セ ŋ ハ = 果 ED 而 管 詳 度 **シ** 

形 未熟す v 足 則 插 能 べり ŋ 圖 チ ク /又之 ニ / 成熟 果 就 間 硬質 テ見 ス 砂 味 w 部 糖 時 w ラ除 治ヲ加 ઁઃ 'n ؞ٙ ハ半透明 茰 シ 果中 = \* テ 其 能 食シ ク熟 果肉ヲ以テ美味 ŀ 假 ナリテ琥珀色ヲ呈スル 或 種皮ヲ具 セ バ强烈ニ 製シテ舎利別トナス 又酷漬品トナス ヘフル **≥**⁄ ノ果膠ヲ造ルベシ、 、平扁多種子ヲ藏ス而シテ此 テ爽快ナルまるめろ様ノ香 = 至 iv 果將 三熟 叉其果汁 セ ン ラ放チ ŀ / 亞麻布 = 如ク ス 適 'n 多漿 一種 ルス叉酸 = 及 附 特 べ 著 别 w ۳ر 過 セ ヲ以 則 ナ デデテ n チ の鐵銹ヲ 風 テ 略 生食 食テ 味ヲ 水" す 渴 生 洗 三適 v ア醫 ば ズ 其 去 及 セ 果 وع # ス

۲



ナ

Averrhoes 氏(第十三世紀/初年ニ死ス)/名譽表彰

1

爲

×

解



葉ニ並穂花同

實 (圖縮) 果

甘

2

ŀ 街 ナ

雖

Æ 舖 3

形

味

頗 果

珍 售

A IV 之ヲ赕

w

21

ズ

九月

下

旬 1.

候

成 即

ス

此

時

再 ヲ失

۴,

同

時

=

花

ヲ發

ラ

花

後

月

=

至

ラ熟

ス =

チ 熟 IV 7 腫

年兩度果實

1

收穫ア

ルナ

y 7

而

V

テ

苗 果

木 實

子

=

依

w

支

廛

銮 テ

藏 葉

フニ

酸

味

旣

去リ盡シテ

タ

モ 那

妙

IJ

Thi

物

熟

ヲ

促

ガ

ス

=

効

7

y

F

云

楊桃 繁殖 翌年 IJ + رر

學名ヲ 半乃至 Ŧi. 或 ナ テオ ý, 花柱 師 色 シ 幹上 時 ŀ 相 セ رر アリ 樹葉 駁 IV かたばみ 云 Averrhoa Carambola ŀ テアリ 暗褐色ヲ呈 鍛尖頭 ラ、 小小枝 テ w 姿頗 種子 花 ハ ス 其 卵形 花中 y 科 = ハ ŀ iv 出 形 • , = 美觀 == 1 子葉 チ小 屬 = ッ 葉 ŀ 十 小 ス 雄 薬 萼 クニ 葉ヲ 互 N ハ w ハ 、之ヲ生 氏並 平扁廣闊 シ 常 = 生 Ŀ 月 テ花 有 7 ハ 2 綠 リ其外 毛ナ ŀ シ之 ラ E 1 奇數 リ八 アヴィセ 1 ズ 小 云フ其屬名 Averrhoa 枝 ŋ 樹 IV = = 方 月 觸 = 3 = 33 = 花冠 滿 テ ŀ 1 v 狀 2 、橢圓 ッ Ŧi. 候 テ繁 r 11 ル時望 自 ナ氏著書ノ名高 y 複 ハ = ハ 葯 發 1ラ 感覺 五 形 葉 7 子房 枝 グラ星 ヲ ヲ 瓣 ラ 觀 缺 ラみ ナ 丰 3 殊 V 如 y テ短 アリ シニ 胚 Ŧī. チ高 ハ ス 成 西班 佳 軸 y 枝 乃 ŀ + テ白 + 雖 花 椏 ナ 至 サ 註 牙 微小 y 1. シ 穗 モ Ŧī.

テ

īffi

色

ヲ

亦對

丈

E

(濱支那街ニ得タル楊林

姓 ヲ取リテリン ハー名陽桃、 ネ氏ノ命名シタル 一名羊桃、 一名洋桃 モ ŀ , 云フ又五歛子、五稜子、 + y 而シテ其種名 Carambola 五瓣子、五梭子ノ別名アリ五飲子 ハ印度 ノ土言ニ 基 + v モ ノ名 ナ 一へ南

行 验 Ħ 四 年 Ŧī. Œ. 大 萄牙人 本品 諸郡 酢ニシ くまるんが、 稜ヲ呼ンデ歛トナ 同屬中楊 香味ナク且酸 印度ニー變種アリちーに シ衆果ト參食スルニ尤モ宜シ(原ト漢文)ト 作ス皮肉詭軟其味初酸ク久シテ甘シ其核奈ノ如シ五月熟シー樹數石ヲ得ベシ十月再ビ熟ス蜜ヲ以テ之ヲ漬ク甘 其大サ拳 本草綱目卷 「ハ梵語ニかるまらト稱シ印度ノ土言ニテハかむらく、 出が南人稜ヲ呼デ廉ト爲ス三廉ト名クト ・テ美ナリ俗亦晒乾シ以テ果ニ充テ食フ、 ァ 渡セ 艞 ジ三十 如シ其色青黃潤綠形チ甚ダ詭異、 取カラ ぷりちト云ヒビルマノ土言ニテハさうんぎあト云フ而シテ印度ニハ往昔**ョ** 類似 シ Æ ズ他ノ砧木ニ接ギテ繁殖セシ ノナラント云へり ス故二以テ名トナスト云 ー(果ノ三、夷果類) 種 アリ ーくむるんがト呼ブ果實小 Averrhoa Bilimbi 二著者李時珍 ヘリ 狀田家 2 雖ドモ或ハ五六稜ナル者アリ之ヲ食フニ汁多シ味甘クシテ且 又三廉子アリ蓋シ亦此類ナ Н ŀ ニシテ普通品ノ宇バアリ熟シテ深緑色ヲ呈シ普通品 ノ碌碡ノ如シ上ニ五稜アリテ ノ日ク五斂子ハ嶺南及ビ閩中ニ 稱 ス支那 たまらとんが、 ノ俗之ヲ三捻 リ陳祈暢 かまらんが、 ト呼ブ本 刻 ムガ 出ヅ閩人呼ンデ楊桃 ガ異物志ニ云ク三廉 樹 ノ葉 リ之レアリ蓋シ始 くるむるんが、 如 2 ハ亦奇數 起 一テ劍脊 羽 みいた ジ如 \*ハ熙安 小為 形ヲ 複葉 ダ葡

ンテ鈍稜 ナシ其小葉 ノ三廉ハ蓋シ本種ヲ アリ楊桃 新世 ハ長橢圓形或 界 銳稜 Æ ナ ナ iv ハ披針形ヲ呈シ萼ニモアリ花 ラ ト同 w Æ ン ŀ ジ 1 , カラズ而シテ種子ニ ナラン見ルベシ三廉三捻音相邇キ 許アリ然ドモ今ハ諸方 一八假種: ハ赤紫色ニシ 植栽 党皮之レ セ ラ ナ テ花穂直チニ幹 シ本品亦楊桃 v 果實食用ニ 供 ト同ジ Ξ. 出ヅ果實ハ長橢圓 スペ ク其原産地 シ 前

百文

形

詳